

Mesures d'Hygiène



Procédure de Nettoyage et Désinfection des locaux d'élevage




1 DEBLAYER

- Après le départ des animaux, sortir le petit matériel sur l'aire de lavage.

2 DETREMPER

- Tremper le sol, les parois et plafonds, afin de faciliter le décapage, à l'eau en basse pression.




3 DECAPER (afin d'éliminer les souillures et matières organiques)

- Evacuer les litières et déjections.
- Appliquer un détergent, le **Diverfoam CL650** ou **Hypofoam** dilué de 3 à 5%, selon l'encrassement, en pulvérisation ou au canon à mousse.
- Temps de contact 20 minutes.
- Décaper à l'eau, en moyenne ou haute pression.




4 DESINFECTER (afin d'abaisser la pression microbienne)

- Appliquer un désinfectant homologué :
- **Viragri Plus** de 0.5 à 2% en pulvérisation ou au canon à mousse.
- Ne pas rincer.



5 DECONTAMINER LES SOLS

- Utiliser le **Divoflow 50**, dilué à 7%, par arrosage au sol sur toute la surface bétonnée, à l'aide d'arrosoir (0.5 litre de solution par m²). Ce produit, à base de soude, va pénétrer dans le sol et détruire les parasites.
- Après le traitement, laisser le local vide pendant 4 à 5 jours avant l'application d'autres produits.



Pour le SAS, il faut prévoir :

- des tenues propres et spécifiques à l'élevage
- douche, chauffage, lave-mains (savon antiseptique **Plus Pure**)
- lave-bottes avec produit désinfectant (**Viragri Plus**)
- équipements individuels de protection



De plus, il convient de :

- protéger toutes les entrées
- dératiser et désinfecter
- interdire l'accès de l'élevage aux animaux domestiques
- désinfecter les véhicules et le matériel servant au transport des animaux

Pour tout conseil et toute adaptation de cette procédure à votre site, n'hésitez pas à contacter votre Responsable Technico-Commercial JohnsonDiversey