

# Noro-virus ja Oxivir Spray

Jos Noro  
vaivaa,  
ota  
Oxivir!

Norovirusinfektio tarttuu herkästi ja itämisaika on lyhyt. Taudin alku on räjähdysmäinen ja se pitkittyi laitoksissa, koska toimintaa ei voi keskeyttää.

## Tärkeimmät tartuntareitit ovat

- kosketustartunta - uloste-suu
- aerosolitartunta - oksennus ja ripuli voivat aiheuttaa ilma- välitteisiä viruspisaroita, jotka leviävät kauemmas (> 1m)
- epäsuora kontakti välittäjien avulla - esim. kosketuspintojen välityksellä
- 10 virusta on jo tartuttava annos - ulosteissa ja oksennuksissa miljoonia viruksia

## Kun epidemia puhkeaa toimi näin:

- Sijoita sairastuneet samaan yksikköön, jos mahdollista.
- Henkilökunta sitoutuu 2-vaiheiseen käsihygieniaan: **pesu** Soft Care Safe Washilla ja **desinfektio** Soft Care Safe Des E:llä.
- Pyyhi kontaktipinnat käyttäen 3 % Oxiviria, jolla kostutat kertakäyttöpyyhkeen. Jos käytät mikrokuitupyhkeitä, ne on pestävä pyykinpesukoneessa vähintään 70 °C ja 10 minuuttia. Muista WC:n seinät sekä WC-istuimen takaosa!
- Käytä eritetahradesinfektiossa 3 % Oxiviria.
- Sairastunut työntekijä saa tulla takaisin töihin, kun hänellä on ollut 2 oireetonta päivää.

**HUOM!** VIRUSTA ERITTYY ULOSTEeseen 1-3 viikkoa. NOROVIRUKSEEN EI OLE ROKOTETTA. TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET OVAT TORJUNTA JA EPIDEMIAN RAJOITTAMINEN.

Jos haluat lisätietoja Oxivirin käytöstä, ota yhteyttä

Marja Pentti,  
Hygieniahoitaja  
0400-762 761  
JohnsonDiversey



JohnsonDiversey  
Clean is just the beginning

